

Sayın Hastamız,
doktorunuz size Gynoflor® reçete ettiği için
aşağıda size daha fazla bilgi vermek istiyoruz.


Gynoflor® bir vajinal tablette iki etkin madde içerir: estriol ve laktobasiller.

Estriol, östrojen grubundan bir hormondur ve özellikle genital bölgede hedefe yönelik tedaviler için kullanılır. Gynoflor®un içeriğinde bulunan estriol 0,03 mg ile çok düşük bir dozdadır. Bu düşük doz bile vajinal dokunun yeniden yapılanmasını uyarır. Gynoflor® hastalığın bulunduğu yerde etki eder ve vücut üzerinde başka bir etki beklenmemektedir.

İçeriğindeki laktobasiller (laktik asit bakterileri), asidik bir vajinal ortama katkıda bulunarak ve olası enfeksiyonların patojenlerini yerinden ederek veya öldürerek, vajinal floranın yenilenmesine yardımcı olabilir.

Gynoflor® kullanımına ilişkin bilgiler:

- Her akşam yatmadan önce bir vajinal tableti vajinanın derinine yerleştirin. Aplikatör kullanmanıza gerek yoktur.
- Tedavi edilmeyen iltihaplı vajinal dokular ağrıya karşı daha duyarlı olabilir; genellikle bu sorun vajinal dokunun yeniden yapılanmasıyla azalır.
- Vajina çok kuruyorsa vajinal tablet yerleştirilmeden hemen önce bir damla su ile nemlendirilebilir.
- Tedavi döneminde cinsel ilişkiye girilebilir.



Dozum:

Tedavinin başlangıcında: _____ gün boyunca, günde 1 kez 1 vajinal tablet

İdame tedavisinde: Aşağıdaki günlerde, haftada _____ kez:

☐ Pt ☐ Sa ☐ Ça ☐ Pe ☐ Cu ☐ Ct ☐ Pz

Gynoflor® canlı ve üreyen laktobasillerin kalıcılığını sağlamak için buzdolabında (+2° ila +8°C'de) saklanır. Gynoflor®u oda sıcaklığında (maks. 1 hafta süreyle 25°C'de) saklamanız, tam olarak etkinliğini koruyacaktır.


Pierre Fabre Pharma acil şifalar diler!

Hasta bilgileri sadece bir doktor tarafından reçete edilen Gynoflor® tedavileri için verilecektir. Gynoflor® hakkında daha fazla bilgi için lütfen kullanım talimatlarına başvurun.
Pierre Fabre Pharma GmbH • Neuer Messplatz 5 • 79108 Freiburg • www.gesunde-vaginalflora.de


Pierre Fabre
Pharma

"Atrofik vajinit" hastalığı hakkında bilgi

Menopozla birlikte, kadın seks hormonlarından biri olan, vücudun kendi östrojenlerinin üretimi azalır. Bu hormonlardaki eksiklik, vajinal atrofiye ve bunun sonucunda atrofik vajinite yol açabilir. "Atrofi" terimi doku kaybını, "vajinit" ise ince (atrofik) doku nedeniyle daha kolay oluşabilecek bir vajinal iltihabını tanımlar.



Hastalığın diğer bir belirtisi de östrojen tarafından vajinal doku uyarılmadığında laktobasiller (laktik asit bakterileri) yeterince çoğalamadığından, koruyucu vajinal floranın kaybolmasıdır. Normalde vajinal florada bulunan laktobasillerin eksik olması durumunda, patojenler yayılabilir ve enfeksiyonlara neden olabilir.

Bu durum çeşitli şikayetlere yol açabilir:

- Vajinal kuruluk
- Vajinal bölgede tahriş, kaşıntı ve yanma
- Vajinal dokunun hassaslaşması nedeniyle daha kolay kanama
- Cinsel ilişki sırasında ağrı
- Artan enfeksiyon oluşumu
- Artmış idrara çıkma isteği, idrar kaçırmaya, sık idrar yolu enfeksiyonları riskinde artış

Sonuç olarak, bu hastalık cinsel yaşam ve dolayısıyla yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki edebilir.

Belirtileri hafifletmeye yönelik çeşitli tedavi yaklaşımları vardır. Tedavi seçeneklerinden biri, vajinal dokunun yeniden yapılanmasını sağlayan lokal hormon tedavisi olabilir. Laktobasiller ile vajinal floranın yeniden kolonizasyonu da vajinal sağlığa katkıda bulunur. Jinekoloğunuzun kararına bağlı olarak bu terapi daha uzun süreli bir idame tedavisi olarak da uygulanabilir.

